

S. Kowalewski
09.12.2016

Strzelce Kraj., dnia 07 grudnia 2016 r.



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

Krzysztof Węgrzyn

616
7



Wg rozdzielnika

Nasz znak
PIW/...../2016

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N8) na terenie Polski oraz zagrożeniem jej wystąpienia na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Kraj., zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców państwa gminy w zwyczajowo przyjęty sposób załączonej ulotki informacyjnej dot. zasad jakich należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed możliwością wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, podtypu H5N8.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Strzelcach Kraj.
Z poważaniem
Krzysztof Węgrzyn
LEKARZ WETERYNARII

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Strzelce Kraj.
2. Urząd Miasta i Gminy Dobiegniew
3. Urząd Miasta i Gminy Drezdenko
4. Urząd Gminy Stare Kurowo
5. Urząd Gminy Zwierzyn

a/a

Załączniki:

1. Ulotka informacyjna dot. H5N8



Powiatowy Inspektorat Weterynarii Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Kraj.

tel./fax: (95) 763-10-58, e-mail: strzelce Kraj. piw@wet.zgora.pl, www.piwstrzelce.pl

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).



Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonek, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.